

HÖSTBLÅSOR

Blåsor i munhålan som kan vara smärtsamma och som i sin tur kan bidra till att det sjuka barnet inte vill äta. Utslag kan också finnas på händer och fötter. Feber och illamående kan också förekomma. En del barn får inga symtom alls.

Orsak

Coxsackievirus. Virus finns i utslag, svalg och i tarmen.

Smittvägar och smittspridning:

Höstblåsor är en vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli sjuka. Barnen blir smittade genom nära kontakt med redan sjuka som utsöndrar virus genom näsa och svalg (droppsmitta). Det är vanligt med utbrott under sommar och höst. Smittade får en livslång immunitet efter att de har tillfrisknat.

Symtom:

Blåsor i munhålan som kan vara smärtsamma och som i sin tur kan bidra till att det sjuka barnet inte vill äta. Utslag kan också finnas på händer och fötter. Feber och illamående kan också förekomma. En del barn får inga symtom alls.

Ska barnet vara hemma från förskolan?

Barnets allmäntillstånd avgör om det ska vara hemma. Eftersom inte alla barn får symtom sprids smittan oftast i hela barngruppen. Att låta barn med symtom vara hemma bryter alltså inte smittvägarna. Det finns även andra orsaker till blåsor i munnen. För mer information, se munsår.

Inkubationstid

Inkubationstiden är 3–7 dagar